

## 1.2.1 HÄUFIGE ARZNEIEN NACH TUMORDIAGNOSEN

Folgende Mittel werden von JONES, PAREEK, RAMAKRISHNAN, SCHLEGEL oder SPINEDI als besonders häufig für die jeweiligen Krebsart angegeben [13, 26, 30, 37, 39, 40]. Da aber gerade frühere Autoren wie Burnett [3], Clarke [6], Jones [13] und Schlegel [32] (auf die auch viele Empfehlungen von Spinedi, Ramakrishnan und Pareek zurückgehen) meist mehrere Mittel - eventuell sogar gleichzeitig - verordneten und bei diesen älteren Autoren nur selten klar wird, welchem Mittel nun die Besserung oder Heilung zu verdanken war, ist die folgende Liste nur als kleine Hilfe bei der Similesuche gedacht und darf keinesfalls andere beim speziellen Fall besser indizierte Mittel zurücksetzen.

### ADHÄSIONEN

nach Operation: Graphites C200, Staphisagria (v.a. bei Urethra-Strikturen) [26, 29]  
Vergleiche auch die Rubrik: HAUT, KELOID: Alumen, Arsenicum album, Badiaga, Bellis perennis, Calcarea carbonica, Calcarea fluorica, Carbo vegetabilis, CARCINOSINUM, Causticum, Crotalus horridus, Fluoricum acidum, GRAPHITES, Hypericum, Jodum, Juncus, Kalium bichromicum, Lachesis, Mercurius, Nitricum acidum, Phosphorus, Phytolacca, Psorinum, Radium bromatum, Rhus toxicodendron, Sabina, SILICEA, Sulfuricum acidum, Sulfur, Tuberculinum, Vipera und vor allem THIOSINAMINUM [36]; siehe auch NARBENKREBS

BLUTKREBS: siehe Leukämie

### BLASEN-Karzinom

JONES empfiehlt Thuja [13]

PAREEK empfiehlt Terebinthina (mit Hämaturie), Arsenicum album (der Patient entspricht dem konstitutionellen Bild von Arsenicum album), Conium, Cantharis (bei sexueller Reizung), Uva ursi (in Urtinktur als organotropes Mittel bei Dysurie) [26]

RAMAKRISHNAN empfiehlt Terebinthina, Thuja, Conium; als Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [30]

BRIDEN nach Operation siehe Adhäsionen

### GALLENGANGS-Karzinom

RAMAKRISHNAN empfiehlt Chelidonium [30]

SCHLEGEL empfiehlt China, Chininum sulfuricum [32]

CLARKE empfiehlt Cholesterinum [6, 26].

### HAUTKREBS

Arsenicum album, Cinnabaris, Conium, Condurango, Euphorbium, Kalium arsenicosum, Kalium sulfuricum, Lapis albus, Petroleum, Radium bromatum, Scrophularia nodosa, Silicea, Thuja, X-Ray [9, 10, 13, 26]

RAMAKRISHNAN empfiehlt Arsenicum album, Arsenicum bromatum (Basalzell-Ca, Squamas-Zell-Ca, Melanom, Haut-Ca nach Bestrahlung), Arsenicum jodatatum [infiziert, nekrotisch], Sulfur, Euphorbium; als Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [29, 30]; MELANOM siehe unten

### MELANOM

### KELOID-Karzinom

Zusätzlich zum Typ-Mittel THIOSINAMINUM D6 zweimal täglich über Monate [29]; auch im Repertorium Krebsleiden in alten Narben: GRAPHITES; Silicea; Carbo animalis, Phytolacca

(Synthesis, Repertorium Universale) [36] und ADHÄSIONEN

#### HIRNTUMORE

RAMAKRISHNAN Plumbum jodatum oder Plumbum, Baryta carbonica, Baryta jodata, Zincum sulfuricum, Zincum, Silicea, Aethusa cynapium (bei Krampfanfällen v.a. mit rollenden Augen); Nosode Carcinosinum [29, 30]

PAREEK hat zusätzlich gute Erfahrung mit Conium [26]

#### HODGKIN-LYMPHOM

RAMAKRISHNAN: Aurum, Jodum, Spongia, Scrophularia nodosa, Thuja; Nosode Carcinosinum, Szirrhinum [30]; Lapis albus, Baryta jodata [10, 13, 26]

#### KNOCHEN-Tumore

Aurum arsenicosum, Aurum jodatum, Aurum muriaticum natronatum, Conium, Hekla lava, Ruta, Symphytum, Phosphorus; palliativ bei Schmerzen Asa foetida [9, 10, 32, 46]

RAMAKRISHNAN Hekla lava (Sarkome, Metastasen), Symphytum (eher Metastasen bei Tumore der Knochenhaut), Aurum, Calcarea carbonica; Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [29, 30]

#### KOLON-Karzinom

SPINEDI empfiehlt Aloe, Thuja, Arsenicum album, Lycopodium, Ornithogalum; Magnesium muriaticum [37, 38, 39, 40]. JONES empfiehlt Condurango, Carbo animalis, Sedum repens, Petroleum, Ruta, Scrophularia nodosa, Sempervivum tectorum [13]

RAMAKRISHNAN empfiehlt Aloe, Thuja, Arsenicum album, Lycopodium; als Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [30]

#### LARYNX- und STIMMBAND-Krebs

Argentum metallicum, Argentum nitricum, Arsenicum album, Nitricum acidum, Phosphorus, Sanguinaria, Thuja [32, 37]

RAMAKRISHNAN empfiehlt Thuja, Phosphorus, Argentum nitricum, Lachesis, Kalium bichromicum; Nosoden Carcinosinum, das ihm zufolge noch besser ist als Szirrhinum [29, 30]

#### LEBER-Krebs

Cholesterinum; Lecithin, Cholin, Phosphorus [9, 10, 13, 26, 37]

RAMAKRISHNAN empfiehlt Chelidonium, Hydrastis, Lycopodium, Natrium sulfuricum, Ceanothus; Chelidonium-Urtinktur gegen Schmerz, neben anderen Mittel; Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [29, 30]; Leber-Metastasen behandelt Ramakrishnan wie primäres Leber-Karzinom, Spinedi mit für den Primär-Tumor indizierten Mitteln.

#### LEUKÄMIE

Der Fall eines Lymphoms wurde von Schlegel mit Ammonium-chloratum C3 behandelt [32]

RAMAKRISHNAN empfiehlt Hekla Lava, Symphytum (v.a. wenn der Patient über Gelenkschmerzen klagt), Ceanothus americanus, Strontium, zusätzlich Konstitutionsmittel; Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum; Erfolge 115 + 205 Patienten 10-25% (-54%) [30].

#### LIPPENKARZINOM

Schlegel gab häufig Arsenicum album, Causticum, Chelidonium, Condurango, Hepar sulfuris, Nitricum acidum, Thuja [32].

#### LUNGENKREBS

RAMAKRISHNAN empfiehlt Lycopodium, Kalium bichromicum, Argentum nitricum, Lachesis,

Hydrastis; Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [29, 30]

#### MAGENKREBS

Arsenicum album, Bismuthum metallicum, Bismuthum-o, Cadmium sulfuricum, Carbo animalis, Calcareo fluorica, Carduus marianus, Condurango (Mundwinkelrhagaden, Kardia-Ulkusnarben), Graphites, Hydrastis, Kreosotum, Ornithogalum (v.a. bei Pylorus-Konstriktion) [13, 32, 37, 38, 40]

Außerdem empfiehlt JONES öfters Aceticum acidum D1, Eucalyptus [13]

COOPER gab in der Urtinktur Crocus sativus, Crocus-ver, Iris versicolor [7]

PAREEK und JONES empfehlen Geranium maculatum [13, 26].

RAMAKRISHNAN gibt Hydrastis, Cadmium sulfuricum, Arsenicum album, Kalium bichromicum; Ornithogalum in der Urtinktur verordnet er palliativ zur Schmerztherapie; als Nosoden Carcinosinum, das R. zufolge besser wirkt als Szirrhinum. [29, 30].

#### MAMMA-Karzinom

JONES empfiehlt Asterias rubens C3, Calcareo jodata D1, Calcareo fluorica in D6, Chimaphila umbellata in der Urtinktur, Kalium muriaticum; Phytolacca [13].

SCHLEGEL gab in Tiefpotenz Arsenicum jodatum D6, Calcareo phosphorica 6, China D3, Ipecacuanha D3, Phytolacca D6; sehr oft Conium D30; außerdem in der D30: Antimonium crudum, Argentum nitricum, Bellis perennis (nach Verletzung und Stoß, hier ist die DD zu Conium erforderlich), Calcareo carbonica, Calcareo jodata, Carbo animalis, Causticum, Clematis (v.a. Szirrhus), Graphites, Hepar sulfuris, Hydrastis, Kalium carbonicum, Lycopodium, Murex, Natrium muriaticum, Nitricum acidum, Phosphorus, Sedum repens, Silicea, Staphisagria, Sulfur, Thuja, Tuberculinum D200. Außerdem behandelte er mit einem Schilddrüsenextrakt von Kalb und Schaf. Einsatz fanden Thyrochrom und Calendula in der Urtinktur als Umschläge über dem tastbaren Tumor. Als schmerzstillende Zwischenmittel in D30 gab Schlegel öfters Bryonia, Belladonna, Rhus toxicodendron; Bufo als Palliativum [32].

PAREEK empfiehlt Apis; Asterias rubens, Bellis perennis, Bufo rana (in fortgeschrittenen Fällen, bei deutlich gesteigertem, vorwiegend auf sich selbst gerichtetem sexuellen Interesse), Carbo animalis, Conium, Condurango; Calendula (heilt Mamma-Ca-Ulzera, gegeben in C30 täglich, oder als Urtinktur in Form einer Kompresse); Graphites (bei Narben-Keloid-Ca), Hydrastis, Phytolacca (Vorgeschichte von Mammafibrose, die sich vor der Menses verschlimmert) [26].

RAMAKRISHNAN empfiehlt Conium, Pulsatilla, Sepia, Phytolacca, Phosphorus; Sanguinaria C30/200 (antiinflammatorisch, wenn Entzündungsprobleme bei Mamma-Ca bestehen); Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [29, 30]

#### MEDIASTINAL-Tumore

RAMAKRISHNAN empfiehlt Thuja, Spongia, Scrophularia nodosa, Hydrastis; Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [29, 30]

#### MELANOM

RAMAKRISHNAN empfiehlt Arsenicum album, Arsenicum bromatum, Causticum, Calcareo arsenicosa; Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [30]

MORBUS HODGKIN siehe HODGKIN-Lymphom

#### MUNDHÖHLE, Krebs in der

RAMAKRISHNAN empfiehlt Aurum muriaticum, Hydrastis; Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [30]

#### NARBEN-Krebs

Krebs, der sich in alter Operationsnarbe entwickelt (v.a. Mamma-Ca); die wichtigsten Mittel nach SPINEDI sind hier Graphites, Carbo animalis, Phytolacca [39]; überdies Silicea, Thiosinaminum [29]

#### ÖSOPHAGUS-Krebs

SPINEDI empfiehlt Phosphorus [40]

JONES empfiehlt Condurango [13]

RAMAKRISHNAN empfiehlt Causticum, Thuja, Argentum nitricum, Silicea, Arsenicum album, Hydrastis; als Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [29, 30]

#### OVARIAL-Krebs

SCHLEGEL machte gute Erfahrungen mit Apis, Lachesis, Lapis albus; als Nosode oft Medorrhinum [32]

RAMAKRISHNAN wählt unter Aurum muriaticum natronatum, Viburnum prunifolium, Thuja, Sepia, Lilium tigrinum, Lachesis; als Nosoden: Carcinosinum, Szirrhinum [29, 30]

#### PANKREAS-Krebs

RAMAKRISHNAN setzt ein Hydrastis; Ceanothus, Arsenicum album, Cadmium sulfuricum, Baryta jodata; die Nosoden Carcinosinum, Szirrhinum [29, 30]; zusätzlich empfiehlt SPINEDI Carbo animalis, Phosphorus [40]

#### PHARYNX-Krebs

SPINEDI verordnet Apis, Arsenicum album, Aurum, Benzoicum acidum, Calcarea carbonica, Carbo animalis, Causticum, Conium, Crotalus horridus, Hydrastis, Kalium cyanatum, Kalium muriaticum, Lachesis, Muriaticum acidum, Nitricum acidum, Phosphorus, Phytolacca, Sepia, Sulfur, Thuja [37]

PAREEK verordnet bei Tonsillen-Karzinom öfters Baryta jodata [26]

RAMAKRISHNAN wählt unter Aurum muriaticum, Baryta jodata, Lachesis (vor allem bei bei Tonsillen-Karzinom) [29].

#### PROSTATA-Krebs

RAMAKRISHNAN hat gute Erfahrung mit Thuja, Conium, Sabal (v.a. bei Krankheiten der Reproduktionsorgane), Lycopodium, seltener Baryta muriatica, Baryta carbonica, Staphisagria, Pulsatilla; als Nosode setzt er eher Szirrhinum wegen der für dieses Mittel charakteristischen Hörte ein, seltener Carcinosinum [30].

### 1.2.2 LEITSYMPTOME VON "KREBSARZNEIEN"

Bei den einzelnen Mitteln wurde versucht, Leitsymptome zu finden, die wahlanzeigend bei Krebs- oder Tumorerkrankung sind. Es handelt sich also vor allem um organotrope oder krebsspezifische Leitsymptome. Diese Leitsymptome wurden hauptsächlich krebsspezifischer Literatur von Burnett, Clarke, Jones, Pareek, Ramakrishnan, Schlegel und Spinedi entnommen. Daher dienen die Mittelbeschreibungen bei bekannteren Arzneien nur einer Bestätigung tumornaher Symptome.

Nur bei den unbekannteren Mitteln - dies sind zumeist tumorspezifische "Organmittel" von Jones und Schlegel - wurde auf eine möglichst vollständige Symptombeschreibung geachtet.

Bei wenigen in der Homöopathie ganz ungebräuchlichen Mitteln - diese gehören überwiegend in das Repertoire von E. Jones - habe ich mich bemüht, auch Synonyme und botanische Zugehörigkeit anzugeben, um entsprechend der Essenz der Arznei-Familie die Thematik mit der des Patienten vergleichen zu können.

Insgesamt mag die Auswahl der Mittel willkürlich erscheinen - hauptsächlich sind es ja Arzneien oben genannter Autoren - und die Beschreibungen mag teils zu kurz, teils aber auch zu lang erscheinen. Bei den vielen möglichen Mitteln bleibt eine derartige Zusammenstellung aber zwangsläufig unvollständig, und vielleicht sollte man auf eine Aufstellung schon bekannter "Tumormittel" verzichten und unvoreingenommen auf die Suche nach dem Simile bzw. Simillimum gehen.

für diese Suche nach dem Simile und vor allem die nach dem Simillimum gilt selbstverständlich das Erfassen des gesamten Arzneimittelbildes mit allen seinen Gemüts-, Allgemein-, §153-Symptomen und Essenzen des Mittels oder der Mittelgruppe, soweit diese Informationen bekannt sind. Darauf konnte hier nur ausnahmsweise eingegangen werden, wenn es sich um Tumor-Symptome handelt. Ein Beispiel hierfür wäre: Apis - stechende brennende Schmerzen im szirrhösen Mamma-Karzinom.

Je "kleiner" bzw. je unbekannter ein Arzneimittel ist, desto wichtiger könnten die hier behandelten Krebs-Leitsymptome sein, und je bekannter eine Arznei ist, desto mehr wird man sich neben den lokalen tumorspezifischen Symptomen auf die Arzneimittelkenntnis verlassen können. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass Schlegel auch bestbekannte Mittel wie Arsenicum album erfolgreich in Tiefpotenz (D3 bis D6) einsetzte. Hierin folgte er seiner Theorie, wenn er das von ihm eruierte Mittel nicht als das Simillimum vermutete.

Bei allen Mineralien und Mitteln aus dem Periodensystem und insbesondere zur Differenzierung unter den in Frage kommenden Salzen ist die Einordnung im Periodensystem nach Jan Scholten [34, 35] eine große Hilfe und, wenn es um die Suche nach dem Simillimum geht, oft unerlässlich. Wie man nach dieser Methode auch bisher in der Homöopathie unbekannte Mittel (wie z.B. Ferrum jodatum) als tumorheilendes Simillimum finden kann, zeigt Dietmar Payrhuber in seinem neuen Buch über homöopathische Krebstherapie [27].

#### ACETIC ACIDUM

Bei Magenkrebs. Jones gab das Mittel in der C1 [13].

Leitsymptome: Große Schwäche. Anämie mit wächserner Blässe. Brennen in der Kehle. Starker Durst. Verhärtungen von Leber und Pylorus [13, 32]

ACIDUM CARBOLICUM (Phenol) siehe Carbolicum acidum

ACIDUM MURIATICUM siehe Muriaticum acidum

ACIDUM NITRICUM siehe Nitricum Acidum

#### ALOE

Kolon-Ca, Rectum-Ca [29]

Leitsymptome: Stuhlentleerung bei Blähungsabgang. Blut im Stuhl. Stuhl wie Gelee; oder Stuhl mit Schleim, blutig. Schneidende brennende Schmerzen. Druckgefühl im Bauch und Auftreibung des Bauchs, infolge Blähungen. Verschlimmerung früh morgens. Verschlimmerung durch Hitze. Besser durch kühle Luft [29, 30]

#### ALUMEN

(Alumn; Alaun; Kalium-Aluminium-Sulfat)

Ein noch spezifischeres Mittel bei verhärteten Schleimhäuten als Alumina [32]

Leitsymptome: Verhärtungsneigung (v.a. um Entzündungen). Brennschmerz. Verschlimmerung abends. Abmagerung. Lähmungen. Große Erkältlichkeit. Stuhlverstopfung bei Trockenheit des

Rektums, wie auch Alumina. Brennende Mastdarmschmerzen bei Tumor [32]

#### ALUMINA

(Tonerde; Aluminiumoxid)

Häufig von Grimmer bei Karzinom eingesetzt [10]

Leitsymptome: Verhärtung von Haut und Schleimhaut. Indurierte Geschwüre. Abmagerung. Lähmungen. Große Erkältlichkeit. Anämie. Neuralgie. Die für Alumina typische trockene Verstopfung [10, 32]

#### ANILINUM

Schlegel vermutete in dieser Substanz ein Krebsmittel, gibt allerdings keine genauere Indikation [32].

#### APIS

Ovarial-Karzinom und viele andere Tumorarten, vor allem zystische kanzeröse Geschwüre [2, 3]. Jones gibt das Mittel bei Mamma-Ca in der D3. Polypen.

Szirrhöses Mamma-Ca [13, 32]

Leitsymptome: Stechende Schmerzen. Brennende Schmerzen. Evtl. Juckreiz. Dunkelviolette Haut (z.B. über Mamma-Ca). Ödeme. Empfindlich gegen Berührung. Durstlos. Geschwüre mit grauem Schorf. Eiter ist hellgelb. Erysipelartige Umgebungsentzündung. Alte Narbe sieht dunkel-purpur aus. Schlechter morgens. Schlimmer durch Wärme [3, 13, 32]

#### APOCYNUM CANNABINUM

Als Einreibung (Urtinktur in Lanolin) auf die Brust zum Erweichen adenoider Wucherungen [13]

#### ARGENTUM METALLICUM

Betroffen sind besonders Larynx, Uterus. Geschwüre auf Knorpel [32]

Leitsymptome: Mager. Reizbar. Chronische Katarrhe, die den Knorpel angreifen. Neigung zu Polypen und Warzen [32]

#### ARGENTUM NITRICUM

Hautzysten, vor allem hydrämische [2]. Uterus-Ca. Karzinome an Schleimhäuten. Mundkrebs, Larynxkrebs, Magenkrebs, Zervixkrebs, Uteruskrebs. Argentum nitricum, als D3 bis D6 gegeben, führte zu etlichen Remissionen [32]

Leitsymptome: Schleimhautulzerationen. Granulationen. Pupurrote Verfärbung.

Uterusblutungen. Blutende Ulzera. Larynxpolypen [32]

#### ARSENICUM ALBUM

Ein sehr wichtiges und sehr wirkungsvolles Krebsmittel, vor allem für epitheliale Tumore (im Bereich von Haut, Schleimhaut, Magen, Darm.) Schlegel setzte Arsenicum album oft in Tiefpotenz als D6 organotrop ein und berichtet zahlreiche Tumorremissionen unter der Wirkung dieses Mittels. [32]

Leitsymptome: Heftige brennende Schmerzen im Tumor, die sich durch Wärme bessern.

Bei Tumorulzera kommt es zu stinkender Absonderung (hier ist die DD zu Carbo animalis notwendig.) [32]

Abmagerung. Schwäche. Ängstliche Unruhe. Mangel an Lebenswärme. Oft sind warme Getränke das einzige, was vertragen wird. Terminalstadium mit Kachexie.

Bei Schmerzen im Terminalstadium sollte man Arsenicum album und Nux vomica des öfteren im Wechsel geben, immer wenn Wirkung nachlässt [30].

#### ARSENICUM BROMATUM

Hautkrebs. Squamöses Karzinom oder Basalzellen-Karzinom. Melanom, nach Bestrahlung. Arsenicum bromatum und Arsenicum jodatum besitzen eine große Wirkung auf die Drüsen. Drüsenverhütung. Morbus Hodgkin.

Arsenicum bromatum ist indiziert bei Krebs zusammen mit Diabetes [29, 30]

Leitsymptome: Starke Rötung der Haut. Brennschmerz. Ulzeration, ohne Infektion (bei Infektion bevorzuge man Arsenicum jodatum) [29, 30]

#### ARSENICUM JODATUM

Brustkrebs und Gebärmutterkrebs [2, 3]. Hautkrebs, mit Infektion und Ulzeration

In niedriger Potenz (D3 bis D6) drei- bis viermal täglich als homöopathisches Antibiotikum [29]

Epitheliom der Lippe. Schmerzhafter Szirrus der Brust mit Exulzeration [13]

Leitsymptome: harter Tumor, sehr druckschmerzhaft. Dabei Schwellung der Lymphknoten.

Absonderungen, die braune Krusten bilden. Brennschmerz in den Lymphbahnen [13, 32].

Schlechter Geruch.

Lungentuberkulose und diabetische Gangrän wurden allein mit Arsenicum jodatum in niedrigen Potenzen geheilt, oder Arsenicum jodatum wurde zusätzlich zu einem Konstitutionsmittel gegeben (hierbei war Arsenicum jodatum indiziert wegen der infektiösen Masse). [29]